

台風16号対策について

平成26年9月19日
営農支援課

I ハウス等施設全般の対策

施設については別添の「ハウス等施設の台風対策」を参照。

II 作物別の対策

1 普通作物

【普通期水稻（登熟期～収穫期）】

（1）事前対策

- ① 深水管理にして倒伏被害の軽減を図る。
※但し、棚田等で畦畔崩壊のおそれのあるところでは控える。
- ② 倒伏すると穂発芽しやすいため、速やかに排水できるよう溝切りや排水溝の整備を行う。

（2）事後対策

- ① 冠水した水田では、速やかに排水する。
- ② 「まいひかり」など登熟途中の稲は、水分蒸散が盛んな時期にあるため、台風通過後も乾燥風等により登熟障害が発生する場合があるので、急な落水は控える。
- ③ 倒伏した稲はできるだけ引き起こすなどして登熟向上に努める。
但し、挫折倒伏（折れた状態）の場合に、無理に株を動かすと損傷を大きくする場合もあるので注意する。
- ④ 倒伏するとウンカや紋枯病等が発生しやすいので、ほ場の観察に努め農薬使用基準を遵守し防除を行う。
- ⑤ ほ場にゴミが飛散した場合は、収穫作業等に支障が生じないように、早めに除去する。
- ⑥ 倒伏し穂発芽や籾汚れ等が多発した場所は、玄米品質が低下する場合があるので、収穫の際は刈り分ける。

【大豆（莢肥大期）】

（1）事前対策

- ① 冠水しないよう溝切りや、排水溝の整備を行う。
- ② 生育の遅れている圃場では、株の折損や倒伏被害の軽減を図るため、土寄せを行う。

（2）事後対策

- ① 湛水しているところでは排水に努め、侵蝕された畦は早めに土寄せする。
- ② 倒伏した株はできるだけ引き起こす。
- ③ ハスモンヨトウや紫斑病の防除時期にあるので、観察に努め防除する。

【そば（生育期）】

（1）事前対策

- ① 冠水しないよう溝切りや排水溝の整備を行う。

(2) 事後対策

- ①冠水したところでは速やかに排水する。

=====

★農作業安全

例年、水田管理等のため増水した河川や水路に近づき、転落等の重大な事故が発生しているため、水位が下がるなど安全な状態になるまで近づかない。収穫機械作業では、十分安全を確認しながら行う。

=====

2 施設野菜

【栽培中のハウス（雨よけ栽培、育苗ハウスも含む）】

(1) 事前対策

- ①ハウスバンドを点検し、ゆるみがないよう、しっかりビニルを押さえる。
- ②ビニルの上から防風ネット等を被覆し、ハウスバンド等で固定して強度を高める。
- ③ハウス妻部には筋かいを入れて補強する。
- ④台風の進路に注意し、ハウス倒壊の危険がある場合（25m以上の風）は、押さえバンドを切ってビニルを除去する。
- ⑤ハウスの周囲は滞水しないように排水溝等を整備する。
- ⑥防風ネットの設置してあるほ場においては、根石や支線の点検を行い風雨により強度が低下しないよう対策を講じる。
- ⑦ハウス周囲を点検し、強風で飛びそうなものは片付けるとともに、燃料タンク等の付帯設備がしっかり固定されているかを確認する。

(2) 事後対策

- ①防風ネット・寒冷紗等は直ちに除去し、通風を良くする。
- ②湛水した場合速やかに排水を行う。
- ③傷害果や幼果は摘果して、草勢の回復を図る。
- ④速効性窒素肥料を成分で10a当り2～3kg施す。
- ⑤草勢の低下や茎葉が損傷すると病害が発生しやすいので、登録農薬を散布する。

【いちご苗】

(1) 事前対策

- ①ほ場周囲の排水溝を整備する。
- ②育苗ハウスのビニルはハウス倒壊回避のため除去する。
- ③苗は、風で飛ばされないよう寒冷紗・防風ネット等を苗の上に直接かけて固定する。

(2) 事後対策

- ①倉庫等に移動した場合は、速やかに育苗ハウスにもどす。
- ②寒冷紗、防風ネットなど苗の上にかけていた被覆資材を直ちに除去し、通風を良くする。
- ③苗の冠部が土に埋まったものは、速やかに土を除去する。
- ④雨風に当たると炭そ病等の病苗が増えるので、病株は早めに除去し、登録農薬を散布する。

【定植前後の施設野菜】

(1) 事前対策

基本的には【栽培中のハウス（雨よけ栽培、育苗ハウスも含む）】の（1）事前対策と同じ。

- ① ほ場周囲の排水溝を整備する。
- ② 定植前であれば、台風通過後に定植をずらす。
- ③ 定植直後で、やむを得ず天井ビニールを除去した場合は、定植済みの苗が風で飛ばされないよう寒冷紗・防風ネット等を苗の上に直接かけて固定する。

(2) 事後対策

- ① 寒冷紗、防風ネットなど苗の上にかけていた被覆資材を直ちに除去し、通風を良くし、病害予防のため早急に登録農薬の散布を行う。
- ② 湛水した場合は速やかに排水を行い、畦を乾燥させる。
- ③ 念のため、土壌のpH・ECを計測し、肥料分が流亡しているようであれば、追肥や液肥のかん注等を検討する。
- ③ 冠水等で苗が被害を受けた場合は、苗の状況を見極めた上で補植や植替え等を検討する。

3 露地野菜

【露地野菜共通事項】

(1) 事前対策

- ① 排水溝等を設置し、雨水の流入を防ぎ排水に努める。

(2) 事後対策

- ① 冠水したほ場では速やかに排水を行う（品目毎に事後対策を参照）。

【果菜類】

(1) 事前対策

- ① ほ場の周囲は滞水しないように排水溝等を整備する。
- ② 栽培ほ場周辺に防風ネットを張る。

(2) 事後対策

- ① 湛水した場合速やかに排水を行う。浸蝕された畦は早めに土寄せ等を行う。
- ② 損傷の激しいものは除去し、傷害果や幼果は早めに摘果、倒れた枝は引き起こして誘因し、受光態勢を整え、草勢の回復を図る。
- ③ 速効性窒素肥料を成分で10a当り2～3kg施す。
- ④ 茎葉の損傷部分や草勢の低下により病気が発生しやすいので、登録農薬を散布する。

【さといも】

事後対策

- ① 早生種は早めに収穫する。
- ② 中晩生の品種が株元まで冠水した場合や根が露出している場合は排水、マルチを剥いで追肥（窒素成分で1～2kg）施し、培土を行う。

【かんしょ】

事後対策

- ① 冠水するといもが変質（脱色等）するので、冠水後は早急に排水を行う。
- ② 根が露出している場合は培土をおこなうか、早めに収穫する。

【にんじん、だいこん、ほうれんそう】

事後対策

- ① 播種直後は大雨により種子の流亡が起こりやすいので、発芽状況を確認して欠株が多いときは播種し直す。また、肥料の流亡が考えられる場合は施肥もやり直す。

【きゃべつ、はくさい】

事後対策

- ① 薬剤散布を行い、少量の窒素肥料を葉面散布して草勢回復を図る。

4 果樹

収穫期であるくり、温州みかん、なし、かきの被害を最小限にとどめるように尽力する。被覆前の施設きんかんや施設日向夏などについては、かんきつ類全般に準じた管理を行う。

【果樹共通】

(1) 事前対策

- ① ほ場への降雨が速やかに排出されるように園内の排水対策を徹底する。
- ② 防風ネットの点検を行う。
- ③ 枝の分岐点が裂けるおそれのある幼木や高接ぎ樹では、枝葉をまとめて結束したり、分岐部を縄で8の字型に縛っておく。

(2) 事後対策

- ① 結束した枝は、早めに解いて蒸れを防ぐ。
- ② 幼木・若木・根元から揺さぶられた樹・倒伏した樹は早急に立て直し、盛り土、根締めを行い、支柱で固定する。
- ③ 枝折れ、枝裂けしたところは切り取り、大きな傷口には塗布剤を塗る。
- ④ 落葉のひどいものには、日焼けを防止するために、石灰乳を塗布する。

【かんきつ類全般】

(1) 事前対策

- ① 風傷による葉や果実へのかいよう病の発生が懸念されるので、襲来前に銅水和剤の散布を行う。
- ② 温州みかんなどのマルチ栽培では、被覆資材が風であおられないように土のう等で固定する。

(2) 事後対策

- ① かいよう病の発生を防止するため、事前の薬剤散布を実施していないところでは、銅水和剤の散布を行う。
- ② 塩害が懸念される場合は、6時間以内に2～3トン/10a以上の水で洗い流す。その後落葉が発生した場合は、程度に応じた摘果（場合によっては全摘果）や枯れ枝の整理を行う。
- ③ 温州みかんなど、褐色腐敗病の発生が懸念される品種では、防除を実施する。薬剤の選択にあたっては、収穫前日数に留意する。
- ④ カメムシの飛来が見られる場合は、収穫前日数に注意しながら薬剤散布を行う。

【マンゴー ビニル除去園】

(1) 事前対策

- ①新葉のかいよう病、炭そ病の発生が懸念されるので、襲来前に銅水和剤の散布を行う。
- ②防風対策として、ネットや寒冷紗等の展張を行う。

【完熟きんかん】

事前対策

- ①強風により果実に傷が発生するため、防風ネットを設置し風を弱めるようにする。
- ②後期加温を計画しているハウスでは、サイドビニルを設置して巻き上げ固定しておく等、被覆の準備を進め、通過直後にすぐに被覆、加温開始ができるようにしておく。

【なし、かき、くり等】

事前対策

- ①棚や防風ネットの補修を早めに行うとともに、棚の揺れの激しいところは支柱を立てて結束するなど補強を行う。倒伏、幹折れの予想される樹は三脚支柱を組む。
- ②なしは、棚線への枝の結付けをよくして、落果防止を図る。
- ③かきやくりの若木は、支柱を補強し枝揺れによる落果ならびに枝折れを防ぐ。

【落葉果樹】

事後対策

- ①病気の発生に注意し、防除基準に準じて襲来後直ちに防除を実施する。収穫が近い場合は、収穫前日数に注意する。
- ②主枝・亜主枝等の太枝が裂けたものでも、毬果・果実の成熟まで枯死しないと思込める枝は、傷口にゆ合剤を塗布してひもなどで固定し、収穫後切り離す。主幹部が折れたものは、萌芽した中の2～3本を育成する。台木から萌芽した場合は春の切接ぎの準備を行う。

5 花き

【露地花き全般】

(1) 事前対策

- ①滞水しないように排水溝を整備する。
- ②マルチは土寄せ、市販止め具等によりしっかりとおさえ、風による剥がれを防ぐ。
- ③生育に応じて、支柱・ネット等で誘引・固定を実施し、茎葉の損傷を防ぐ。
- ④ほ場周辺の片づけを行い、飛来物による作物の被害を防ぐ。

(2) 事後対策

- ①冠水・浸水があった場合は、速やかに排水作業を行う。
- ②必要に応じて殺菌剤、液肥の葉面散布、追肥を行う。

【シキミ】

(1) 事前対策

- ①幼木は倒れる可能性があるので、支柱で固定する。

②枝が折れたり、裂ける恐れのある部分については、他の枝とまとめて結束するなど補強を行う。

(2) 事後対策

- ①湛水、冠水した場合は、速やかに排水を行う。
- ②倒れた木、傾いた木は無理に起こすと根が切れて、枯死する場合がありますので、段階的に起こして、正常な状態に戻す。
- ③枝折れ、枝裂けしたところは切り取り、大きな傷口には塗布剤を塗る。
- ④ほ場に土砂が流入した場合、根の活力が低下して枯死する場合がありますので速やかに株の周りの土砂を取り除く。

【キク・露地電照】

(1) 事前対策

- ①切り前が近く、収穫が可能なものはできるだけ収穫をして十分に水揚げをする。

(2) 事後対策

- ②倒伏したものは曲がり防止のためできるだけ早めに引き起こし、薬剤散布を行う。

【施設・雨よけ花き全般】

(1) 事前対策

- ①排水溝の整備、防風ネットの設置を行う。
- ②草丈がある程度伸びたものは、支柱を補強し、誘引ネット等の張りを強化して倒伏を防止する。
- ③ハウス内のかん水チューブやスプリンクラー・ミスト施設は風で飛ばないように収納あるいは固定する。

(2) 事後対策

- ①湛水、冠水した場合は、速やかに排水を行う。マルチ栽培の場合はマルチをはがして畦を乾燥させる。
- ②台風後の高温・強日射の被害を防ぐために寒冷紗等で被覆を行う。
- ③茎・葉の損傷が発生した場合は、薬剤防除・液肥の葉面散布等を行う。
- ④電照や夜冷育苗等、電気機器を使用する品目では、機器が正常に稼働するか点検・確認を実施する。

【スイートピー】

(1) 事前対策

- ①ネットへの誘引の前であれば、ハウスの被覆を剥ぐことを想定し、防風ネットでトンネル被覆を行う。

(2) 事後対策

- ①降雨等により畦の表面が硬く締まった場合は、浅く中耕し、通気性・透水性を良くする。
- ②欠株が多い場合は、わき芽を利用し複数本に仕立てるか、補植を行う。

【コショウラン他、冷房ハウス、冷蔵庫等】

(1) 事前対策

- ①長期停電に備え、自家発電等を用意する。
- ②夜冷育苗中のデルフィニウム等の苗は、夜冷库内に収納する。
- ③外部遮光、被覆等は除去するかハウス上部に巻き上げて固定する。

(2) 事後対策

- ① 落雷等により停電した場合は冷房設定を再度確認する。
- ② 夜冷育苗の場合は、台風通過後、すみやかに遮光資材等の被覆を元に戻し、苗を夜冷庫から外に出す。その他は施設花き全般に準ずる。

6 特用作物（茶）

(1) 事前対策

- ① 1～2年生の茶園では、防風ネットを設置する。また、株元やマルチ資材への土寄せにより、株の揺れやマルチのばたつきを防止するとともに、排水対策を実施する。
- ② 2～3年生の茶園では、徒長枝の整剪枝を実施する。
- ③ 茶工場（煙突、屋根、雨とい、窓等）の点検・整備・補強を実施する。

(2) 事後対策

- ① 風雨による倒伏や地際部に損傷を受けた幼木園では、株元やマルチ資材への土寄せ、補修を実施する。
- ② 海からの風で塩分が付着したとみられる茶園では、塩分付着8時間以内にスプリンクラー等で散水（5mm以上）し、塩分を除去する。
- ③ 強風により葉の損傷を受けた茶園では殺菌剤を散布する。
- ④ 滞水・浸食部分の速やかな排水処理と改修を実施する。

7 畜産

【畜産全般】

(1) 事前対策

- ① 畜舎の防風対策を十分に行い、特に開閉部はしっかりと固定するなど、破損に注意する。
- ② 特に山間部では、道路の通行止めが予想されるため、飼料（配合飼料、青刈り、サイレージ含）は、余裕をもって準備する。
- ③ 停電が予想されるので、発電機の手配とともに、試運転を事前に行う。
- ④ 断水の可能性がある場合には、最小限の飲水量を給水タンク等で確保する。
- ⑤ 家畜ふん尿等が、流出しないよう、必要な対策を行う。

(2) 事後対策

- ① 浸水した畜舎は、台風通過後に速やかに消毒する。

【養豚・養鶏】

(1) 事前対策

- ① 鶏舎内への雨の打ちこみを避け、床に湿り防止を行う。

(2) 事後対策

- ① 台風通過後は、急激に気温が上昇することがあるので、肥育豚及び出荷前のブロイラーでは、畜舎を開放するなど換気に努める。

【飼料作物】

- ① 発芽間もない飼料作物は、長期間の冠水で湿害が予想されるので、ほ場周辺に排水溝を設置し水が貯まりにくいようにする。冠水した場合は速やかに排水する。

別添 「ハウス等施設の台風対策」

営農支援課

【事前対策】

① 防風ネットの設置
防風ネットはあらゆる強風対策の基本であり、必ず設置する。

② 被覆資材の補強
被覆資材がはがれる被害は、屋根の両端の破れが引き金となる。
図1の ■ 部分をネットで保護する。




図1 被覆資材の補強

③ ハウス本体の補強
ハウス本体にシワ・タルミがあると、耐風性は大幅に低下する。必ず確認を行なう。
出入り口はしっかりと閉じて固定する。出入り口の増やすとともに、締め直し補強する。ハウスバンドの両側のヨリ鋼線や支柱を支えるラセン杭も補強する。硬質ハウスでは天窓の補強も重要となる。ロープ等でしっかりと固定する。

④ 排水対策の徹底
ハウス内に雨水が流入しないように、周囲の排水溝の整備を徹底する。また、ハウスが連棟の場合、谷水を「とい」などで排水路まで導き、ハウス内に入らないようにする。

⑤ 自動開閉装置対策
ハウスを締め切ったあと、温度センサーによって換気部が動き出さないようにする。

⑥ 燃料タンク対策
台風により、広範囲が冠水しているときに、燃料タンクが倒れたり、配管の破損等による燃料油が流出すると、農作物だけでなく施設周辺に被害を及ぼすので、タンクの固定ボルトの増し締め、配管付近の片付けを行う。

⑦ 換気扇の利用
換気扇がある場合には、換気扇によってハウス内を低圧状態に保つこととで、ハウスの揺れを防止する。また、停電に備え非常用電源を準備する。

⑧ 倒壊の恐れがある場合
ハウス倒壊の危険がある場合には、押さえバンドを切ってビニールを除去し、ハウスの倒壊を防ぐ。
また、雨中の作業では、飛来物に注意し、転落事故にも気を付ける。

【事後対策】

通過後一気に晴れてしまうことが多いので、換気対策を優先し、換気部の補強を解き、自動開閉装置の設定を元に戻す。
ビニールが破損した場合は、速やかに補修する。
滞水した場合は、速やかに排水を行なう。