

# 『今月の天候と農作業』

通巻第5589号  
3月号  
平成28年3月3日発行  
宮崎県  
宮崎地方気象台



## 【特に注意を要する事項】

期間のはじめは、気温がかなり高くなる見込みです。

## 【予報のポイント】

期間のはじめは気温がかなり高くなり、向こう1か月の気温は高いでしょう。低気圧や前線の影響で、向こう1か月の降水量は多いでしょう。

## 【確率(%)】

要素	予報対象地域	低い (少ない)	平年並	高い (多い)
気温	九州南部	10	30	60
降水量	九州南部	20	30	50
日照時間	九州南部	40	40	20

## 【予想される向こう1か月の天候】

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

向こう1か月の平均気温は、高い確率60%です。降水量は、多い確率50%です。日照時間は、平年並または少ない確率ともに40%です。

週別の気温は、1週目は、高い確率70%です。2週目は、平年並または高い確率ともに40%です。3～4週目は、平年並または高い確率ともに40%です。

### <1週目の予報> 3月5日(土)～3月11日(金)

天気は数日の周期で変わり、気圧の谷や湿った気流の影響で雨が降る日があるでしょう。

※明日から1週間の、費別の天気や気温などは、

週間天気予報 (<http://www.jma.go.jp/jp/week/>) を参照してください。

### <2週目の予報> 3月12日(土)～3月18日(金)

天気は数日の周期で変わるでしょう。

### <3週目から4週目の予報> 3月19日(土)～4月1日(金)

天気は数日の周期で変わるでしょう。

## 普通作物

### ◆ 早期水稲

---

#### 1 育苗管理

寒暖の差が大きく、ハウス管理に気をつかう時期です。緑化は通気性のある被覆資材で2～3日遮光し、温度管理は日中は25度まで、夜温は15度を確保します。かん水は午後に行うと床土温が下がり多湿となるので、午前中に行います。床土が過湿の時は必要はありません。硬化時期には10度以下の低温や25度以上の高温に遭うと、ムレ苗や苗いもち等が発生しやすくなるので注意します。田植え7日前頃から外気に慣らします。

#### 2 本田準備

ほ場の漏水が激しいと水温が上がりにくく、肥料や除草剤の効果も不安定となります。また寒波時の深水対策も難しくなるので代掻きは丁寧に行い、畦の補修を行います。基肥施用時期は早過ぎると成分が減少するので、できるだけ代掻き頃に全層を鋤込みます。

#### 3 病虫害防除

いもち病対策として田植前に薬剤箱処理を行います。購入苗では既に処理済みの箱もあるので確認します。また苗箱に除草剤を誤散布する事故に注意します。

#### 4 移植作業と除草対策

寒波時は無理に移植せず日延べし、移植後は深水で防寒します。栽植密度は、早期水稲では有効茎（穂数）が不足しやすいので、極端な疎植は避けましょう。

除草剤は、散布時期や水深で効果が左右されます。軟弱苗や強風時の散布、浅水で拡散が不十分な時は薬害が発生しやすくなります。ラベルを熟読し適切に使用し、散布後7日間は落水せず管理します。

### ◆ ムギ類

---

雨が多くなるため、周囲や畦間に排水溝を設けます。赤かび病が多発しやすいので、裸麦・小麦では穂揃期に、大麦では穂揃い期から7～10日後（葯殻抽出期）に防除し、天候を踏まえその7日後頃にも行います。

（鎌田 博人）

## 施設野菜

### ◆ 共通事項

---

蒸散量が多くなるため、かん水量を増やしますが、かん水間隔を短くして回数を増やすことで全体のかん水量を増やすようにします。日中は内カーテン等を活用して日射量を調節し、十分換気を行いハウス内の温度が高くなるように注意します。夜温が高い場合は内カーテンを開放し、加温機や循環扇での送風で葉や果実の結露を防止します。

### ◆ きゅうり

---

蒸散量が増加すると葉の老化が進み草勢が低下しやすくなります。高温乾燥がその原因なので内ビニル等を活用して日射を弱め湿度を確保します。高温になると果形も乱れやすくなるため、十分な換気に努めますが、今作は暖冬傾向であり黄化えそ病（MYSV）が多く発生しています。害虫の飛込みを防止し、薬剤防除も徹底します。

### ◆ ピーマン

---

ハウス内が高温になると授粉がうまく行えず、奇形果の発生や果実の肥大不良による赤果等の発生につながります。十分換気を行いハウスが高湿多湿にならないようにします。

気温の上昇とともに収穫までの日数も短くなるため、最低でも3～4日間隔での収穫に心がけ、草勢維持に努めます。混み合っている枝を整理し、光線が中まで入るように整枝・剪定を行い、白果の発生を防止します。

### ◆ トマト

---

ミニトマトは気温上昇にともない裂果が増加します。土壌水分の急激な変化が主な原因ですので、こまめに少量多回数のかん水を行います。

トマトは、高温で乾燥すると尻腐果が発生しやすくなるのでかん水量を増やしていきます。また、草勢の低下で小玉果になりますので追肥も遅れないように注意します。

### ◆ いちご

---

温度は出来る限り生育適温に近づけ、低温管理をこころがけます。ハダニ

類が多く発生しています。薬剤が均一に付着するよう、古葉や収穫の終わった果梗の除去はこまめに行い、定期的な薬剤散布を行います。

(黒木 正晶)

## 葉茎根菜類・いも類

下旬から沿海地では、ほうれんそうや小松菜等の葉菜、ごぼう、オクラの播種期になります。育苗が必要なものは、キャベツ、深ねぎなどがあり、作付計画を立てて適期に播種します。また、トンネル栽培では日中の気温が高くなるため換気作業を徹底しましょう。

### ◆ スイートコーン

---

トンネル栽培は間引きの時期ですので、本葉4～5枚の頃に健全で揃ったものを1株に整理しましょう。マルチ内が乾燥する場合は畦間や株元へのかん水を行ってください。また、ハウス栽培や大型トンネル栽培で、雄穂抽出期を迎えるものについては、雄穂が出始めたならチッソ成分で5～6kgを追肥しましょう。

### ◆ らっきょう

---

上旬は追肥の時期となります。球の肥大と生育促進のため、チッソ成分で2～3kg程度を遅れないように施用し、球の緑化を防止するため併せて土寄せを行います。

### ◆ さといも

---

早生種の定植期になります。連作障害が出やすいので連作は避けます。また、栽培ほ場はセンチュウ消毒を行います。種いもは、病害虫のあるもの、芽つぶれのあるものはしっかり除き、健全なものを大きさ順（30～50g程度）に揃え、センチュウや乾腐病の消毒を行って定植します。

### ◆ 食用かんしょ

---

トンネル栽培では換気作業を徹底します。苗床では温度管理を徹底し、気温の高い日は外気にさらして徒長を防ぎ、健苗の育成に努めます。

## ◆ しょうが

---

4月に植付け予定の普通栽培では、欠株をなくし生育を揃えるため催芽を行います。幅120㍍、深さ15㍍の溝を作り、種しょうがを2段重ねて並べ、吸水させたワラで覆い、10㍍くらいの厚さに土をかけ、その上をビニルで覆います。催芽による芽の長さは1㍍以内とします。期間は20日間程度かかります。

(杉村 幸代)

## 果樹

### 1 常緑果樹

---

#### ◆ かんきつ全般

樹勢強化や新梢・花芽の充実のために春肥を施用しましょう。春肥の吸収効率を高めるためには、速効性の肥料を萌芽直前に施用するのが効果的です。また、発芽期から開花期にかけて、窒素主体の葉面散布を数回行いましょう。特に前年の着花数が少なかった園では多くの花が咲いて多くの養分を必要とするので、徹底して行いましょう。

#### ◆ 完熟きんかん

収穫が終了したら、縮間伐・剪定の時期です。枝が隣接樹に当たりだしたら縮間伐を行いましょう。剪定は、樹勢や樹齢を考慮し、主枝、亜主枝の配置を考えながら、樹冠内部まで日が当たるようにしましょう。近年、切り返し剪定によって強い枝が発生し、実が着きにくい状況が見られます。剪定は、間引き剪定を基本とし、短めの枝を多く確保しましょう。剪定の遅れは、枝の充実を遅らせ、一番花の結果を悪くします。剪定は4月上旬までには終わらせましょう。

#### ◆ 日向夏

3月に入ると露地日向夏の収穫が始まります。減酸の早い早生日向夏から収穫を開始し、在来日向夏は減酸を確認してから収穫しましょう。

## ◆ マンゴー

幼果期から果実肥大期には、薬害が発生しやすくなります。薬剤散布は、晴天日の午前中の、薬液が速やかに乾く環境下で行いましょう。

果実の赤色の部分を増やすために、果実のつり直しを行い、緑色の側にも光を当てるようにしましょう。

3月になると、次第に日射が強くなり、日焼け果が発生することがあります。内カーテンや遮光ネットを利用し、日焼けを防止しましょう。

## 2 落葉果樹

---

### ◆ 梅

開花期～展葉期に病害虫が一斉に発生します。予防や初期防除を実施しましょう。

(山口 和典)

## 花き

### ◆ 夏秋ギク

---

7月出荷作型の挿し芽を上旬から行います。挿し穂は無病で充実した揃いの良いものを晴天の午後に採穂します。6月出荷作型の「フローラル優香」は消灯前後を問わず生育期間全般での低温が貫生花の発生を助長しますので、電照期間中から気温を確保するように努めましょう。また、「精の一世」については親株時の低温遭遇によって幼若性を獲得している場合があるので、定植後から12度程度で加温を行いましょう。

### ◆ スイートピー

---

今年は秋から冬にかけての高温・曇雨天の影響により、草勢のバランスを崩している状況が見られます。3月に入ると天気が不安定になり、さらに草勢の維持が難しくなるため、対応が遅れないように植物を十分に観察し、草勢の維持に努めましょう。液肥の施用にあたっては、根を傷めないように高濃度の液肥の使用は避けましょう。3月に入ると気温が不安定な日が増えてきますので、細やかな温度管理に努めるとともに、花卉の花しみや灰色かび病の発生を低減するため、十分に換気するとともに、微生物農薬の使用や除

湿のために強制的な送風を行いましょう。下旬から採種の交配期になります。採種を行う株は必ずつる下げを行い、かん水は控えましょう。

#### ◆ デルフィニウム

---

沿海地域では3番花の出荷時期になります。気温が上昇してきますので、軟弱にならないよう昼間の換気は十分に行うとともに、必要に応じて葉面散布等も行いましょう。

#### ◆ ホオズキ

---

8月出荷作型の植え付け期になります。萌芽時の生長点の焼けを防ぐため、マルチの穴あけは適期に行いましょう。気温が上昇しハウス内への害虫の侵入も多くなりますので、防虫ネットの設置やほ場周辺の防除に努めましょう。

#### ◆ ラナンキュラス

---

3月に入ると気温が上昇し、開花が早くなります。気温に応じ切り前を調節しましょう。日中の温度管理は収量確保のため15度程度としましょう。

(中村 広)

## 畜産

今月は気候が暖かくなり、家畜にとっては生産性が向上する時期となりますが、気温の日較差が大きい季節でもあり、特に朝・夕の冷え込みには十分注意が必要です。夜間はカーテンを閉め切り、舎内温度を確保し、気温が上昇する昼間はカーテンを開けて空気を入れ替えを行いましょう。

#### ◆ 家畜防疫対策

---

韓国では今年に入り、豚での口蹄疫が発生しています。また、中国、台湾等の東アジア地域においては、口蹄疫の発生が続発しており、侵入リスクは高い状況ですので、農場消毒等の徹底的な防疫の実施を行いましょう。また、鳥インフルエンザや他の感染症についても、気温の日格差が大きくなる季節は、家禽や家畜の免疫力が低下して、病気にかかり易くなる季節です。消毒等の防疫対策の徹底とともに、畜舎環境の改善についても十分に行いましょう。

## ◆ 家畜の飼養管理

---

今月は、季節の変わり目で外気温の日格差が大きく、家畜が体調を崩しやすい時期となります。このため、朝夕の畜舎カーテンの開閉や、舎内温度が上昇する昼間は、換気扇による換気、細霧による湿度管理等を行い、舎内の温湿度環境を整えるようにしてください。また、病気の発生時に早期対処ができるように、家畜の健康状態の観察を徹底しましょう。

(三角 久志)

## 特用作物

### ◆ 茶

---

#### 1 春整枝

春整枝は、2月下旬～3月上旬の平均気温が10度となる頃を目安に実施します。整枝の高さは、葉層を8芽程確保できるように、去年の最終摘採面から3～5芽上げた位置とします。また、秋整枝を実施した茶園では、越冬芽にかからない高さで丁寧に整枝します。但し、再萌芽が目立つ茶園では、出来るだけ再萌芽した芽が残らないように高さを調節します。

#### 2 芽出し肥の施用

芽出し肥は、一番茶摘採の25日前までに硫安等の速効性肥料を施用します。各地域の施肥基準に準じ、うね間だけでなく株元近くまで幅広く施用します。施用後は、流亡防止と分解促進のためうね間を軽く攪拌します。

#### 3 防霜対策

防霜を開始する時期は、秋整枝した茶園では一番茶萌芽の15日前から、春整枝した茶園では春整枝直後からとし、いずれも一番茶の摘採が終了するまで実施します。

防霜ファンの設定温度は、萌芽期前後は3度、一～二葉期は5度、二葉期以降は7度とします。スプリンクラーで防霜する場合は、摘採面の気温が2度以下となったら散水を開始するようにします。

#### 4 カンザワハダニの防除

カンザワハダニの防除適期は、2月下旬～3月上旬頃の春整枝後です。各地域の暦に準じ、裾部や葉裏へ薬液が十分にかかるように散布します。



## 5 定植

露地で育苗した苗の定植は、2月下旬～3月中旬が適期です。ハウス等の施設内で育苗した苗は、定植後の極端な低温を避けるため、一番茶前（4月）の定植が適切です。なお、ペーパーポット苗を定植する場合は、定植後の乾燥防止のためポットの上部が植穴より上に出ないように注意が必要です。

## 6 チャトゲコナジラミの発生の確認

県内でも平成26年よりチャトゲコナジラミの発生が確認されています。この害虫は、茶葉の裏面に寄生しています。茶葉の裏面に見慣れない虫等を発見した際は、最寄りの農業改良普及センター等関係機関へ連絡をお願いします。

（黒木 清人）

### ◆ しいたけ

---

#### 1 採取

発生したしいたけは、目標の品柄に応じて適期に採取します。

雨子(あまこ)での採取は、乾燥に時間がかかる上、品質低下の原因になりますので、なるべく晴天を選んで日和子(ひよりこ)で採取します。また、ほだ木の表面を傷めないように、かつヒダに触れないように丁寧に採取します。

採取容器は通気性が良く、浅いもの（専用の採取カゴ等）を使い、ヒダに触れないよう柄を上にして入れます。採取後は、振動を少なくして、できるだけ早く乾燥場に運び、エビラなどに広げて品質の低下を防ぎます。特に雨子(あまこ)は素早く処理します。

#### 2 乾燥

高温での急激な乾燥は品質の低下を招きます。乾燥初期は低めの温度設定とし、乾燥機内の温・湿度、換気に注意しながら徐々に温度を上げます。

（吉行 浩太郎）

### ◆ たばこ

---

品質・収量の確保に向けて適期・適切に健苗の移植に努めましょう。

1 移植は、葉数が9～10枚（米粒大の心葉まで含めた枚数）の白い根が肥土全体に覆っている根張りの良い苗を選んで行いましょう。

葉数が少ない小苗を移植すると、本畑での活着と生長が遅くなり、また大苗では、本畑初期の低温による不時発蕾（葉数減少）を招きやすくなります。

植穴は、直径10～13cm、深さ13～15cm程度に揃えましょう。

極端な深植え、浅植えは、初期生育が遅れ、不揃いの要因となります。

また、移植の際は、泡土が露出しないよう注意しましょう。泡土が露出していると乾燥し、根の伸張が悪く、活着が遅れ、不揃いの要因となります。

移植後は、移植苗の確認手直しを行い、活着促進に努めましょう。

1 移植後の管理作業として、

①排水溝の完備を徹底し、生育不良、病害発生防止に努めましょう。

②マルチ片の回収袋を設置し、植付け穴のちぎれそうなマルチ、ほ地内に飛散しているマルチ片を回収しましょう。

③ドリフト（農薬飛散）対策として、他作物が隣接する場合は、周辺農家との話し合いを行い、障壁物の設置等を行いましょう。

④黄斑えそ病の発生が懸念される場合は、防虫ネットの設置や共同防除に向けた話し合いを行い、発生防止に努めましょう。

（宮崎県たばこ耕作組合）

## 内容の詳細について

---

3月の天候と農作業の詳細内容について。執筆は県営農支援課及び森林経営課、宮崎県たばこ耕作組合が担当しています。各作物の病害虫の防除対策、気象災害の事前事後対策等の詳細は最寄りの支庁・農林振興局（農業改良普及センター）へ

☆「今月の天候と農作業」はホームページにも掲載していません。

(<http://nougyoukishou.pref.miyazaki.lg.jp>)

## 向こう1カ月間における農作物の主な病害虫の発生量と防除対策

農作物名	病害虫名	発生量	発生状況と防除対策
早期水稲	いもち病	—	育苗時に発生がなくても本田で早期に発生する恐れがあるので、移植時の箱施薬を徹底します。
	スクミリンゴガイ	並	越冬場所である水田土壌表層部を細かく耕耘して殺貝します。この場合、土壌は硬く、耕耘ピッチは小さいほど効果が高くなります。1月下旬調査では未耕耘水田での生貝率が高かったためスクミリンゴガイの発生水田では注意が必要です。用排水路からの侵入を防ぐため、水の出入り口にネットを設置する等して侵入を防ぎます。
施設野菜類	病害全般	—	天候の変化には細心の注意を払い、施設内の温湿度管理を徹底するとともに早期防除に努めます。 また、今後は夜温も高めに推移することから、加温機が稼働しない日は施設内が多湿になり、病害の発生が助長される傾向があるので特に注意が必要です。
冬春きゅうり	うどんこ病 べと病 灰色かび病 褐斑病 黄化えそ病 (MYSV) メキイロアザミウマ	やや少 並 やや少 並 前年より多 く、前々年 より少ない やや少	いずれの病害も多発すると防除効果が上がりにくいので予防に重点をおき、発生が見られたら初期防除を徹底します。また、罹病葉は重要な感染源となるので、適宜除去し園外に持ち出します。 黄化えそ病の感染株を確認した場合は、速やかに抜き取り、ビニール袋等に入れて完全に枯れるまで密封処理します。また、黄化えそ病を媒介するミナミキイロアザミウマは、発生初期に防除するとともに、卵と蛹には薬剤がかかりにくいので、最少でも7日間隔で3回の連続した防除を行います。
	病害虫全般(改植時の留意点)	—	ウイルス病を媒介するアザミウマ類、コナジラミ類などの微小害虫に対しては、抜根する前の防除を徹底するとともに、抜根後は少なくとも20日間は蒸し込みます。次作の定植時に薬剤を施用し、害虫類の防除を徹底します。
冬春ピーマン	うどんこ病 斑点病 黒枯病	やや少 並 並	斑点病・黒枯病は多湿条件で発生しやすいので、ハウス内の適正な温湿度管理、排水対策等を徹底します。 また、罹病葉は重要な感染源となるので、適宜除去し園外に持ち出します。
	アザミウマ類 タバココナジラミ	並 やや多	両害虫とも、今後暖くなるにつれて増加する恐れがあります。特にアザミウマ類の発生が多いところでは、最少でも7日間隔で3回の連続的な薬剤散布を行い防除を徹底します。
冬春トマト	葉かび病 灰色かび病 黄化葉巻病 (TYLCV) タバココナジラミ	並 並 並 やや多	葉かび病、灰色かび病は多湿条件で発生しやすいので、施設内が過湿にならないよう換気に努めます。 トマト黄化葉巻病の発病株は伝染源になるので、早期に根ごと抜き去り適切に処分するとともに、媒介虫であるタバココナジラミの防除も徹底します。
冬春いちご	うどんこ病 * 炭疽病 ハダニ類 アブラムシ類	やや多 並 並 並	いずれの病害虫も多発してからでは根絶は困難なので、低密度のうち定期的に防除を行います。 ハダニ類は、複数の殺ダニ剤に抵抗性をもつ個体群が確認されているので、物理的に窒息死させる気門封鎖剤を防除体系に組み込みます。
カンキツ	そうか病 かいよう病  ミカンハダニ	並 並  並	いずれの病害も越冬病斑は伝染源になるので、発見したら直ちに剪除します。そうか病は、春葉での感染が多いと開花後果実への感染を抑えることは難しいので、発芽初期の防除は必ず行います。 生育密度が高いほ場や冬季マシン油乳剤を散布できなかったほ場では、春季(3月上中旬、萌芽前)にマシン油乳剤による防除を行います。
茶	カンザワハダニ	やや少	防除適期は、増殖が始まる前の密度の低い時期(～3月中旬)です。株の内部やすそ部の葉裏に多く生息しているので、十分に薬液が到達するようていねいに防除します。

- 1) \*は防除情報を発表しています。
- 2) 「発生量」は、過去10年間の発生量と比較して、今後の発生量がどの程度になるかを予測したものです。
- 3) 病害虫防除・肥料検査センターのホームページアドレスは、<http://www.jpnp.ne.jp/miyazaki> です。